

۱۵۹

A

نام:

نام خانوادگی:

محل اقامت:

۱۵۹۸

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه
۱۳۹۴/۱۲/۱۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکторی (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۵

علوم باغبانی (کد ۲۴۰۸)

تعداد سوال: ۹۰

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	آمار و طرح آزمایشات، زئیک عمومی، اصول باغبانی	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص خلیلی و حلقوی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای عقوبات و فشار می‌شود.

آمار و طرح آزمایشات:

- ۱ فردا اگر هوا ابری شود به احتمال ۴۰٪ باران خواهد بارید. احتمال ابری شدن هوای فردا ۸۰٪ است، در این صورت احتمال بارندگی چند درصد است؟
- (۱) ۶۸
(۲) ۵۰
(۳) ۴۰
(۴) ۳۲
- ۲ از خاک‌های منطقه‌ای ۷۰ درصد شور می‌باشد، ۵۰ درصد از خاک‌های شور و ۳۰ درصد از بقیه خاک‌ها، قلیابی هستند. در صورتی که یک نمونه تصادفی از خاک منطقه مذکور گزینش شود، چند درصد احتمال می‌رود که خاک آن قلیابی باشد؟
- (۱) ۹
(۲) ۳۵
(۳) ۴۴
(۴) ۵۰
- ۳ به چند طریق می‌توان ۵ گلدان با تیمارهای متفاوت را در ۵ بلوک قرار داد؟
- (۱) ۱
(۲) ۵
(۳) ۲۵
(۴) ۱۲۰
- ۴ از ظرفی حاوی ۵ مهره با علامت‌های A، B، C، D و E با جایگذاری دو مهره را به درپی برمی‌داریم. کدام مورد درست است؟
- (۱) احتمال آنکه مهره اول A و مهره دوم B باشد $\frac{1}{15}$ است.
- (۲) احتمال آنکه هر دو مهره دارای علامت A باشد $\frac{1}{20}$ است.
- (۳) احتمال آنکه هیچ کدام از مهره‌ها A نباشد $\frac{12}{25}$ است.
- (۴) احتمال آنکه در دو مهره انتخابی، A و B وجود نداشته باشد $\frac{9}{25}$ است.

-۵ از یک نوع کالای ساخته شده بوسیله یک کارخانه، ۲۵٪ دارای نقص فنی تشخیص داده شده است. اگر ۳ واحد از محصول کارخانه به صورت تصادفی انتخاب شود، احتمال آنکه در ۳ واحد انتخاب شده حداقل یک واحد ناقص باشد، چقدر است؟

- (۱) $\frac{3}{4}$
 (۲) $\frac{7}{8}$
 (۳) $\frac{25}{32}$
 (۴) $\frac{27}{32}$

-۶ در جعبه‌ای ۲ مهره سیاه و ۱ مهره سفید با اندازه مساوی وجود دارد. اگر با جایگذاری، ۳ مرتبه مهره‌ای را انتخاب کنیم، احتمال آنکه از مهره‌های انتخابی دو مهره سفید باشد، چقدر است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
 (۲) $\frac{2}{5}$
 (۳) $\frac{2}{9}$
 (۴) $\frac{5}{9}$

-۷ هفت نفر متمایز به چند طریق می‌توانند در هفت طبقه از یک آبار تمان هفت‌طبقه‌ای ساکن شوند به شرطی که از بین آنان علی پایین‌تر از حسن و حسن پایین‌تر از احمد باشد؟

- (۱) ۸۷۰
 (۲) ۸۴۰
 (۳) ۸۲۰
 (۴) ۸۱۰

-۸ دانشجویان دو رشته تحصیلی جمماً ۷۲ نفر در درس آمار، ۶۷ نفر در درس فیزیک و ۶۵ نفر در هر دو درس قبول شده‌اند. اگر ۵ نفر در هر دو درس مردود شده باشند، دو رشته تحصیلی چند دانشجو دارد؟

- (۱) ۱۳۲
 (۲) ۷۹
 (۳) ۷۷
 (۴) ۷۲

-۹ اگر دو پیشامد A و B مستقل باشند، $P(A \cap B) = \frac{1}{2} P(A) P(B)$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
 (۲) $\frac{1}{3}$
 (۳) $\frac{2}{3}$
 (۴) $\frac{5}{6}$

-۱۰ در کدام مورد، توزیع پواسن تقریب خوبی برای توزیع دوجمله‌ای محسوب می‌شود؟

- (۱) $P = 0.04$ ، $n = 25$
 (۲) $P = 0.28$ ، $n = 50$
 (۳) $P = 0.58$ ، $n = 60$
 (۴) $P = 0.93$ ، $n = 150$

-۱۱ متهمی که در حقیقت مقصراً نباشد اما قاضی حکم به مجرمیت وی صادر کند، قاضی چه نوع اشتباهی را مرتکب شده است؟

- (۱) اول
 (۲) دوم
 (۳) اول یا دوم
 (۴) هم اول و هم دوم

-۱۲ اگر حدود اعتماد ۹۶٪ میانگین جامعه‌ای از ۴۰ تا ۵۰ باشد، کدام مورد درست است؟

(۱) ۹۶٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور باشد یا ۴٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی خارج از محدوده یادشده باشد.

(۲) ۹۶٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور یا خارج از آن باشد.

(۳) ۴٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور باشد.

(۴) ۹۶٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور نباشد.

-۱۳ آزمون نیکویی برآزandن با استفاده از کدام آماره انجام می‌گیرد؟

- Z (۱)
 t (۲)
 F (۳)
 χ² (۴)

-۱۴ روش کمترین توان‌های دوم در چه مورد به کار می‌رود؟

- (۱) آزمون تجزیه واریانس
 (۲) برآزandن بهترین خط رگرسیون
 (۳) تعیین حداقل همبستگی داخلی بین متغیرها
 (۴) در قضیه حد مرکزی برای تعیین نرمال بودن داده‌ها

۱۵- برآورد معادله خط رگرسیون داده‌های جدول زیر کدام است؟

X	۱	۳	۳	۲	۱
Y	۲	۵	۴	۳	۳

$$Y = \frac{3}{4} + \frac{2}{1} X \quad (1)$$

$$Y = \frac{2}{1} + \frac{3}{4} X \quad (2)$$

$$Y = \frac{1}{4} + \frac{2}{1} X \quad (3)$$

$$Y = \frac{3}{4} - \frac{2}{1} X \quad (4)$$

۱۶- در آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چند مشاهده در هر واحد آزمایشی، خطای نمونه‌برداری دلالت بر کدام مورد دارد؟

- (۱) نوع مشاهدات بین واحدهای آزمایشی تیمارهای مختلف
- (۲) نوع مشاهدات بین واحدهای آزمایشی هر تیمار
- (۳) نوع مشاهدات بین همه واحدهای آزمایشی
- (۴) نوع مشاهدات در هر واحد آزمایشی

۱۷- در یک طرح کاملاً تصادفی ۴ تیمار در ۵ تکرار ارزیابی شده و از هر واحد آزمایشی ۳ نمونه مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. چنانچه مجموع مربعات (SS) کل، تیمار و خطای نمونه‌برداری به ترتیب ۴۹۰، ۲۰۰ و ۵۰ باشد، مقدار \bar{S}_X^2 برای مقایسه میانگین تیمارها کدام است؟

- (۱) $\sqrt{2}$
- (۲) $\sqrt{3}$
- (۳) ۱
- (۴) ۲

۱۸- در یک آزمایش به صورت بلوک‌های کامل تصادفی، ۴ تیمار در ۶ تکرار ارزیابی شده و مقدار SSR جدول برای دامنه‌های $P = ۲$ و $P = ۳$ و $P = ۴$ باشد، مقدار $LSD_{SS_e} = ۳۶^{\circ}$ آزمایشی برابر باشد، مقدار LSD برای مقایسه میانگین تیمارها کدام است؟

- (۱) ۳
- (۲) ۶
- (۳) ۸
- (۴) ۱۰

-۱۹- برای مطالعه پوشش گیاهی ۴ منطقه، به ترتیب ۱۱، ۱۸، ۱۶ و ۱۴ نمونه به روش تصادفی گرفته شده است. درجه آزادی خطای آزمایشی کدام است؟

- (۱) ۳
(۲) ۵۵
(۳) ۵۸
(۴) ۵۹

-۲۰- درجه آزادی اشتباہ نمونه برداری در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۸ تیمار، ۴ تکرار و ۲ نمونه در هر واحد آزمایشی برابر کدام است؟

- (۱) ۱۸
(۲) ۲۰
(۳) ۳۲
(۴) ۶۴

-۲۱- در صورتی که سودمندی نسبی بلوک‌های کامل تصادفی با ۵ تکرار نسبت به طرح کاملاً تصادفی ۱۲۰ درصد باشد، در این حالت کدام مورد درست است؟

- (۱) میزان دقت در ۵ تکرار در طرح بلوک‌های کامل تصادفی معادل ۴ تکرار طرح کاملاً تصادفی است.
(۲) میزان دقت در ۶ تکرار در طرح بلوک‌های کامل تصادفی معادل ۵ تکرار طرح کاملاً تصادفی است.
(۳) طرح بلوک‌های کامل تصادفی حداکثر ۱۲۰٪ نسبت به طرح کاملاً تصادفی مزیت دارد.
(۴) میزان دقت در ۵ تکرار در طرح بلوک‌های کامل تصادفی معادل ۶ تکرار طرح کاملاً تصادفی است.

-۲۲- در یک مربع لاتین 2×2 با ۵ تکرار مربع، درجه آزادی ردیف در مربع و خطای آزمایشی به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟

- (۱) ۴ - ۵
(۲) ۵ - ۵
(۳) ۴ - ۹
(۴) ۹ - ۹

-۲۳- اگر \bar{S}_L در یک مربع لاتین 4×4 برابر $\sqrt{2}$ باشد، مجموع مربعات خطای کدام است؟

- (۱) ۲۴
(۲) ۳۲
(۳) ۶۴
(۴) ۹۶

-۲۴- در یک طرح مربع لاتین داده‌های زیر به دست آمده است. میانگین مربعات مقایسه $(A + B)$ در مقابل $(C + D + E)$ کدام است؟

t	A	B	C	D	E
جمع	۴	۵	۲	۱	۲

- (۱) ۱/۵
(۲) ۲/۵
(۳) ۳/۰
(۴) ۱۵/۰

- ۲۵- در یک آزمایش فاکتوریل ۲^۳ میانگین تیمارها = ۱۰ ، $a = ۱۶$ و $b = ۲۹$ و $ab = ۲۹$ می‌باشند. مقادیر اثر اصلی B و اثر متقابل AB به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) ۴ - ۹ (۲) ۸ - ۹ (۳) ۴ - ۱۵ (۴) ۸ - ۱۵
- ۲۶- در یک آزمایش، دو فاکتور A و B به ترتیب در ۴ و ۲ سطح به صورت فاکتوریل بررسی شده و مقدار میانگین مربعات A برابر ۱۰ و مجموع مربعات (SS) فاکتور A در هر کدام از سطوح B (SS_{A/b_۱} و SS_{A/b_۲}) به ترتیب ۱۵ و ۲۷ به دست آمده است، مقدار میانگین مربعات (MS) اثر متقابل AB چقدر است؟
- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۱۲ (۴) ۴۲
- ۲۷- در یک آزمایش فاکتوریل ۲^۴ در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ۵ تکرار، اثر متقابل ABCD اختلاط کامل روی داده است. درجه آزادی تیمار و خطأ به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟
- (۱) ۵۵ - ۱۴ (۲) ۵۶ - ۱۴ (۳) ۵۶ - ۱۵ (۴) ۶۰ - ۱۴
- ۲۸- در صورتی که در یک آزمایش ۲^۳ با ۵ تکرار اثر متقابل ABC اختلاط کامل داشته باشد، درجه آزادی تکرار و بلوک داخل تکرار به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) ۵ - ۴ (۲) ۹ - ۴ (۳) ۹ - ۵ (۴) ۱۰ - ۵
- ۲۹- یک طرح کرت‌های خردشده با ۴ تاریخ کاشت (عامل اصلی) و ۳ واریته در قالب طرح مربع لاتین اجرا شده است، کدام مورد به ترتیب از راست به چپ، درجه آزادی E_b و E_a است؟
- (۱) ۲۴ - ۶ (۲) ۳۶ - ۶ (۳) ۲۴ - ۱۲ (۴) ۳۶ - ۱۲
- ۳۰- سه رقم از یک گونه گیاهی تحت چهار شدت نوری متفاوت در دست مطالعه است. چه نوع طرح آزمایشی توصیه می‌شود؟
- (۱) فاکتوریل (۲) مربع لاتین (۳) کرت‌های خردشده (۴) کرت‌های خردشده در زمان

رئیسیک عمومی:

- ۳۱ کدام ترکیب، باعث جلوگیری از سنتز پروتئین در باکتری‌ها می‌شود؟

(۱) سفوتاکسیم (۲) پنی‌سیلین (۳) کلرامفنیکل (۴) آمپی‌سیلین

-۳۲ ماهیت پرایمر (آغازگر) در همانندسازی پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها، به ترتیب از راست به چه کدام است؟

(۱) RNA – RNA (۲) DNA – RNA (۳) DNA – DNA (۴) DNA و RNA – RNA

-۳۳ در سلول‌های بدنی انسان، ۴۶ کروموزوم وجود دارد. چند عدد کروموزوم آتوزومی در یک اول انسان موجود است؟

(۱) ۲۱ (۲) ۲۲ (۳) ۲۳ (۴) ۴۶

-۳۴ اگر زن وابسته به جنس به صورت غالب باشد، کدام مورد درست است؟

(۱) در زنان بیشتر از مردان دیده می‌شود. (۲) در زنان کمتر از مردان دیده می‌شود.

(۳) در تمام فرزندان پسر یک پدر که خصوصیت را دارد، دیده می‌شود.

(۴) اگر مادر این خصوصیت را داشته باشد، هیچ کدام از فرزندان پسری آن را به ارث نخواهد برد.

-۳۵ عمل همانندسازی DNA در فرایند تقسیم میوز، در چه موللهای از یک چرخه سلولی آغاز می‌شود؟

(۱) دیاکنیز (۲) بعد از پروفاز I (۳) قبل از لپتون (۴) آغاز آنافاز II

-۳۶ در تلاقي $\text{GG} \times \text{AAbbDDgg} \times \text{aaBBddGG}$ ، چه نسبتی از نتاج در نسل F_2 به صورت A-B-ddgg می‌باشد؟

(۱) $\frac{9}{81}$ (۲) $\frac{256}{81}$ (۳) $\frac{22}{256}$ (۴) $\frac{9}{256}$

-۳۷ اگر یک DNA خطی به طول 4096 bp را با یک آنزیم برشی که دارای جایگاه برش ۴ نوکلئوتیدی است برش دهیم، انتظار می‌رود چند قطعه روی ژل دیده شود؟

(۱) ۱۶ (۲) ۱۷ (۳) ۱۸ (۴) ۲۵

-۳۸ از کدام چرخه PCR قطعات دی ان ایی که تکثیر می‌شوند، دارای طولی دقیقاً برابر با طول موردنظر هستند؟

(۱) چرخه اول (۲) چرخه سوم (۳) چرخه چهارم (۴) چرخه پنجم

-۳۹ موتاژن شیمیایی EMS (اتیل متیل سولفونیت) عمدتاً چه نوع موتاسیون‌هایی تولید می‌کند؟

(۱) بی معنی (Nonsense) (۲) دگر چارچوب (Frame shift) (۳) نقطه‌ای (از نوع Transversion) (۴) نقطه‌ای (از نوع Transition)

-۴۰ در تلاقي آزمون سه نقطه‌ای، اگر زن سوم لحاظ نشده باشد، معمولاً فاصله بین دو زن چقدر برآورد می‌شود؟

(۱) دقیقاً معادل واقعی (۲) بیشتر از مقدار واقعی (۳) کمتر از مقدار واقعی (۴) گاهی کمتر و گاهی بیشتر از مقدار واقعی

-۴۱ به درصدی از افراد یک جمعیت که اثر یک ژن غالب را نشان می‌دهند، گفته می‌شود.

(Expressivity) (Penetrance) (۱)

(Codominance) (Hemizygosity) (Peliotropy) (۳)

-۴۲ از ازدواج زن و مردی با گروه خونی AB، احتمال اینکه فرزند اول آن‌ها پسری با گروه خونی A باشد، چقدر است؟

$\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۱)

$\frac{1}{16}$ (۴) $\frac{1}{8}$ (۳)

-۴۳ از خود تلقیحی یک گیاه تری‌هیبرید، چه نسبتی از نتاج حداقل دو صفت را به صورت غالب نشان می‌دهند؟

$\frac{27}{64}$ (۲) $\frac{9}{64}$ (۱)

$\frac{54}{64}$ (۴) $\frac{36}{64}$ (۳)

-۴۴ اگر یک مارپیچ DNA ۷۵۰۰ باز تیمین داشته باشد، در صورتی که در این مارپیچ ۴۲۰۰۰ پیوند هیدروژنی وجود

داشته باشد، تعداد بازهای گوانین در این مارپیچ چقدر است؟

۶۵۰۰ (۱) $\frac{9}{64}$ (۱)

۹۷۵۰ (۳) $\frac{36}{64}$ (۳)

-۴۵ اگر ژن A دارای سه آلل A_1 , A_2 و A_3 و ژن B دارای ۴ آلل B_1 , B_2 , B_3 و B_4 باشد، تعداد انواع ژنتیپ‌های

خلاص برای این دو ژن چند عدد است؟

۷ (۱) $12 \times 2 = 24$

۱۶ (۳) $12 \times 4 = 48$

-۴۶ ترتیب ژنی فرد هتروزیگوت AaBb که از خودگشتنی آن گامات‌های با نسبت‌های $aB = 15\%$, $AB = 15\%$,

$Ab = 35\%$ و $aB = 35\%$ تولید می‌شود به صورت با فاصله دو مکان ژنی واحد نقشه

می‌باشد.

$\frac{A}{a} \frac{B}{b}$ (۲) $\frac{a}{A} \frac{b}{B}$ (۱)

$\frac{A}{a} \frac{b}{B}$ (۴) $\frac{A}{a} \frac{B}{b}$ (۳)

-۴۷ یک قطعه DNA رمزگردان یک پلی‌پیتید را چه می‌نامند؟

(Hot spot) (Intron) (۱)

(Open reading frame) (Ori) (۳)

-۴۸ در یک جمعیت فراوانی آلل «B» گروه خونی برابر $5/5$ و فراوانی آلل «O» برابر $3/5$ است. چند درصد از افراد گروه

خونی A هتروزیگوت هستند؟

۲ (۱) $2 \times 5/5 = 10\%$

۱۶ (۴) $2 \times 3/5 = 12\%$

-۴۹ پدیده جبران ذی کروموزوم X در انسان، به کدام صورت انجام می‌گیرد؟

(۱) تشکیل جسم بار در ماده‌ها (۲)

(۴) غیرفعال شدن کروموزوم X در نرها (۳)

- ۵۰- نسبت ژنتیپ به DNA مثل نسبت فنوتیپ به کدام مورد است؟
- (۱) رنوم
(۲) RNA
(۳) پروتئین
(۴) mRNA
- ۵۱- تعداد نتایج حاصل از خودگشتنی یک بوته F_1 برای دو صفت پرزدار بودن برگ و شکل دانه به صورت (پرزدار و گرد ۱۷۹، پرزدار و بیضوی ۱۶، صاف و گرد ۵۹ و صاف و بیضوی ۲۱) می‌باشد. از نظر ژنتیکی کدام مورد درست است؟
- (۱) دو زن مستقل
(۲) دو زن با اپیستازی غالب
(۳) دو زن با اپیستازی ساده
(۴) دو زن پیوسته (لينکاج ناقص)
- ۵۲- اگر یک گیاه مونوپلولئید با $X = 9$ کروموزوم تقسیم می‌یوز انجام دهد، احتمال به دست آمدن یک گامت زنده (دارای مجموعه کامل کروموزوم‌ها) چقدر خواهد بود؟
- | | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| $\frac{1}{512}$ | (۲) | $\frac{1}{256}$ | (۱) |
| $\frac{1}{64}$ | (۴) | $\frac{1}{128}$ | (۳) |
- ۵۳- در شروع رونویسی در پروکاریوت‌ها، RNA پلی‌مراز به کدام مورد متصل می‌شود؟
- (۱) اپراتور (گردنده)
(۲) پرایمر (آغازگر)
(۳) ریپرسور (بازدارنده)
(۴) پرموتور (راهانداز)
- ۵۴- با فرض توزیع تصادفی بازها در DNA و مساوی بودن چهار نوع نوکلتوئید، با هضم کامل یک مولکول DNA_{۴۰۰} کیلوباری توسط یک آنزیم برشی ۶bp اختصاصی، حدوداً چند قطعه تولید می‌شود؟
- (۱) ۱۰۰
(۲) ۱۰۰
(۳) ۲۲۰
(۴) ۲۴۰
- ۵۵- کمترین پایداری و بیشترین مقدار (محتوی) به ترتیب از راست به چپ مربوط به کدام یک از مولکول‌های RNA می‌باشد؟
- | | |
|-----------------|-----------------|
| rRNA – tRNA (۲) | rRNA – mRNA (۱) |
| tRNA – mRNA (۴) | tRNA – rRNA (۳) |
- ۵۶- اگر یک بیماری ژنتیکی در جمعیت انسانی با فراوانی ۴ در ۱۰۰۰۰ دیده شود، در صورتی که تعادل هارדי واینبرگ در جمعیت حاکم باشد، احتمال تولد فرزندان مبتلا به این بیماری در ازدواج نوع ژرمنی (مثل ازدواج دخترعمو و پسرعمو) چقدر خواهد بود؟
- (۱) ۰/۰۲
(۲) ۰/۰۱۶
(۳) ۰/۰۰۱۶
(۴) ۰/۰۰۰۴
- ۵۷- کدام اسید امینه شکننده ماریچ آلfa می‌باشد؟
- (۱) گلیسین
(۲) پرولین
(۳) فنیل آلانین
(۴) متیونین
- ۵۸- تغییر شیمیایی در مولکول‌های rRNA چیست و به کمک کدام مورد به ترتیب از راست به چپ عملی می‌شود؟
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| (۱) متیلاسیون کربن ۲'-ریبوz و snoRNA | (۲) snoRNA |
| (۳) متیلاسیون کربن ۳'-ریبوz و snoRNA | (۴) snoRNA |

- ۵۹- در یک پروتئین تنظیم‌کننده با دامنه (Domain) زیپ لوسین حداقل چند زنجیره آلفا وجود دارد؟
- (۱) ۲ (۲) ۶ (۳) ۴ (۴)
- ۶۰- نسبت فنوتیپی در نسل F_2 حاصل از F_1 با ژنتیپ $AaBb$, در صورتی که بین آللهای مکان اول رابطه غالبیت کامل و بین آللهای مکان دوم رابطه هم‌بارزی وجود داشته باشد، نسبت فنوتیپی به کدام صورت می‌باشد؟
- (۱) (۱:۲:۱:۲:۴:۲:۱:۲:۱) (۲) (۲:۴:۲:۱:۲:۱) (۳) (۳:۶:۳:۱) (۴) (۹:۶:۳:۱)

اصول باغبانی:

- ۶۱- کاربرد تابستانه کدام تنظیم‌کننده رشد گیاهی، می‌تواند تراکم گل‌ها و میوه‌های آلو را در سال بعد کاهش دهد؟
- (۱) اکسین (۲) اتیلن (۳) جیبرلین (۴) سایتوکینین
- ۶۲- آبیاری نامناسب (کم یا زیاد) در درختان میوه، به چه دلیل باعث ریزش گل و میوه می‌شود؟
- (۱) تولید اتیلن در شرایط کم‌آبی و غرقابی (۲) تولید ABA در شرایط کم‌آبی و غرقابی (۳) تولید اتیلن در شرایط کم‌آبی و تولید ABA در شرایط غرقابی (۴) تولید ABA در شرایط کم‌آبی و تولید اتیلن در شرایط غرقابی
- ۶۳- آغازه گل در جوانه‌های کدام میوه، به صورت منفرد (تنها حاوی گل) می‌باشد؟
- (۱) فندق (۲) خرمalo (۳) انگور (۴) گلابی
- ۶۴- کدام مورد جزء روش‌های غیرفعال مقابله با سرمایزدگی است؟
- (۱) آبیاری بارانی (۲) تولید دود غلیظ (۳) کشت ارقام دیر گل (۴) استفاده از بخاری
- ۶۵- کدام مورد از نظر تعداد کروموزوم، با یقینه متفاوت است؟
- P. armeniaca* (۴) *P. salicina* (۳) *P. cerasus* (۲) *P. avium* (۱)
- ۶۶- در کدام درخت میوه، سایه‌دهی روی میوه، باعث افزایش کیفیت میوه می‌شود؟
- (۱) انار (۲) سیب (۳) انگور (۴) گیلاس
- ۶۷- تمایزیابی گل آذین محصول اول و محصول دوم انجیر، به ترتیب چه زمانی انجام می‌شود؟
- (۱) پاییز سال قبل - اوخر زمستان سال قبل (۲) اوایل بهار سال جاری - اوخر تابستان سال جاری (۳) اوخر زمستان سال قبل - همان سال روی شاخه سال جاری (۴) اوخر تابستان سال قبل - همان سال روی شاخه سال جاری
- ۶۸- هدف اصلی از تکثیر مرکبات به روش **Shoot tip grafting** کدام است؟
- (۱) کاهش احتمال شیمر (۲) افزایش گیرایی پیوند (۳) تولید گیاهان شبیه به مادر (۴) تولید نهال عاری از ویروس

- ۶۹- عدم تأمین نیاز سرمایی، چه عارضه‌ای در درختان پسته ایجاد می‌کند؟

(۱) عدم تکامل مغز و لاغر و چروکیده ماندن آن

(۲) رشد رویشی زیاد درخت در بهار سال بعد به دلیل عدم باروری

(۳) تأخیر در گلدهی و عدم هماهنگی بین زمان شکوفایی گل‌های درختان نر و ماده

(۴) رشد زایشی زیاد درخت در بهار سال بعد به دلیل کاهش رشد رویشی

- ۷۰- دلیل سال آوری مركبات کدام است؟

(۱) رشد رویشی بیش از حد

(۲) تولید جیبرلیک اسید زیاد در بذرها

(۳) ریزش جوانه‌های گل در سال پر محصول

- ۷۱- کدام مورد در باره تراکم کاشت بذر و قطر ریشه هویج درست است؟

(۱) با افزایش تراکم کاشت بذر قطر ریشه افزایش می‌یابد.

(۲) با افزایش تراکم کاشت بذر از قطر ریشه هویج کاسته می‌شود.

(۳) تراکم زیاد بذر در هویج ممکن است عملکرد را نیز کاهش دهد.

(۴) قطر ریشه در هویج ژنتیکی است و تراکم بذر تأثیری روی آن ندارد.

- ۷۲- مزه تند در فلفل به دلیل وجود کدام ماده است؟

Capsanthin (۴)

Capsorbin (۳)

Carotene (۲)

Capsaicin (۱)

- ۷۳- کاشت عمیق نشاء در کدام سبزی ایجاد مشکل خواهد کرد؟

(۱) گوجه‌فرنگی

(۲) کلم

- ۷۴- کدام سبزی می‌تواند دوره برداشت طولانی تری داشته باشد؟

(۱) کلم‌پیچ

(۲) کلم تکمه‌ای

(۳) کلم قمری

- ۷۵- رقم‌های گوجه‌فرنگی که برای پرورش در گلخانه اصلاح می‌شوند، باید دارای چه ویژگی‌ای باشند؟

(۱) نیاز نوری کمتری داشته باشند تا بتوان با تراکم بیشتر آن‌ها را کاشت.

(۲) قابل تربیت شدن بوده و میوه‌ها هم‌زمان برسند.

(۳) ساقه قوی بوده و میوه‌ها هم‌زمان برسند.

(۴) دارای غالبية انتهایی قوی باشند.

- ۷۶- کدام مورد در باره تولید غده در سیب‌زمینی درست است؟

(۱) تعداد استولون‌ها با تعداد غده‌ها برابر است.

(۲) استولون‌های بلندتر، غده‌های درشت‌تر تولید می‌کنند.

(۳) استولون‌های کوتاه‌تر، غده‌های درشت‌تر تولید می‌کنند.

(۴) بوته‌های با شاخه‌های اصلی بیشتر تعداد بیشتری استولون و غده تولید می‌کنند.

- ۷۷- بذر کدام گروه از سبزی‌ها، طول عمر (ماندگاری) کمتری دارد؟

(۱) پیاز - تره - تره‌فرنگی

(۲) اسفناج - شلغم - کلم‌گل

(۳) ترب - تربچه - نخودفرنگی

(۴) خربزه - خیار - هندوانه

- ۷۸- در مورد محصولات جالیزی که به صورت کپه‌ای کشت می‌شوند، کدام مورد درباره تنک کردن درست است؟

(۱) یک عملیات غیرضروری است.

(۲) یک عملیات الزامی است که در یک مرحله انجام می‌گیرد.

(۳) یک عملیات الزامی است که در دو مرحله انجام می‌گیرد.

(۴) جزء عملیات داشت است که می‌توانیم از آن اجتناب کنیم.

- ۷۹- سفید کردن کوفس‌های سبز به چه منظور است؟

(۱) تنها ترد شدن دمبرگ‌ها

(۲) کاهش طعم تند و ترد شدن دمبرگ‌ها

(۳) کاهش ویتامین A و ترد شدن دمبرگ‌ها

(۴)

کاهش طعم تند و افزایش ویتامین A دمبرگ‌ها

- ۸۰- هنگام انجام عملیات مقاوم‌سازی نشای سبزی‌ها، دقت و احتیاط در مورد نشای کدام سبزی‌ها بیشتر لازم است؟

(۱) برگی (۲) میوه‌ای (۳) دوساله (۴) چندساله

- ۸۱- در تولید چمن فرش (sodding)، اهمیت بخش‌های مختلف چمن چگونه است؟

(۱) بخش روزمزینی مهم‌تر از بخش زیرزمینی است.

(۲) بخش زیرزمینی مهم‌تر از بخش روزمزینی است.

(۳) اهمیت هر دو بخش روزمزینی و زیرزمینی یکسان است.

(۴) در ابتدای رشد، بخش زیرزمینی مهم‌تر است ولی پیش از برداشت، بخش روزمزینی مهم‌تر است.

- ۸۲- کدام گیاهان زینتی، دارای غده هستند؟

(۱) آنمون و آلاله

(۲) سیکلامن و زبان پس قفا

(۳) تاج‌الملوک و مروارید

- ۸۳- در آبیاری گیاهان گلداری به صورت ضربانی (Pulse) در مقایسه با روش دستی (Hand watering)، کدام مورد درست است؟

(۱) امکان تنش رطوبتی در آبیاری ضربانی بیشتر است.

(۲) رشد گیاه در آبیاری ضربانی کمتر از دستی است.

(۳) تعداد دفعات آبیاری بیشتر ولی مصرف مواد غذایی و آب کمتر است.

(۴) تعداد دفعات آبیاری کمتر و صرفه‌جویی در مصرف آب بیشتر است.

- ۸۴- کدام عوامل محیطی، باعث افزایش کاربرد کند کننده‌های رشد بهمنظور کنترل ارتفاع گیاهان زینتی می‌شود؟

(۱) دمای بالا - نور کم (۲) آبیاری کم - نور کم

(۳) دمای پایین - نور زیاد

- ۸۵- کدام مورد، از ویژگی‌های Washed Sod نیست؟

(۱) بدون خاک بودن

(۲) مناسب زمین‌های ورزشی

(۳) سبک بودن و تراپری راحت‌تر

(۴) نامناسب بودن انتقال در هنگام متفاوت بودن خاک محل تولید و کشت

- ۸۶- کدام گل‌های بریدنی، زمین‌گرایی منفی دارند و در تراپری دچار مشکل می‌شوند؟

(۱) داودی - رز (۲) میخک - شببو (۳) گلایول - شببو (۴) ژربرا - آنتوریوم

-۸۷ - seed mixture نسبت به seed چه وضعیتی دارد؟

- (۱) ایجاد تنوع کمتر و یکنواختی بیشتر
- (۲) ایجاد تنوع یکسان ولی یکنواختی بیشتر
- (۳) ایجاد تنوع بیشتر و تحمل بیشتر شرایط نامساعد محیطی
- (۴) ایجاد تنوع و یکنواختی یکسان و تحمل بیشتر شرایط نامساعد محیطی

-۸۸ در کدام شرایط، کیفیت گل‌های بریدنی گل میخک در گلخانه به حد اکثر می‌رسد؟

- (۱) هوای گرم - شدت نور بالا
- (۲) هوای خنک - شدت نور بالا
- (۳) هوای خنک - طول روزهای بلند
- (۴) هوای گرم - طول روزهای بلند

-۸۹ مشکل عدمه کشت و نگهداری نارون چیست و چه گیاهانی را می‌توان به جای آن به کار برد؟

- (۱) برگ‌خوار نارون - زیتون‌تلخ (*Melia*) و چنار (*Platanus*)
- (۲) کنه تارعنکبوتی - داغداغان (*Celtis*) و چنار (*Platanus*)
- (۳) برگ‌خوار نارون - داغداغان (*Celtis*) و آزاد (*Zelkova*)
- (۴) کنه تارعنکبوتی - زیتون‌تلخ (*Melia*) و آزاد (*Zelkova*)

-۹۰ کنترل طول ساقه گل‌دهنده در ژربرا، معمولاً به چه وسیله‌ای امکان‌پذیر است؟

- (۱) تغییر pH و رطوبت نسبی
- (۲) تغییر EC و طول روز
- (۳) تعداد برگ و شدت نور
- (۴) DIF و برخی از کند کننده‌های رشد

